

Micología

Pérez Vilchis Francisco Xavier

Generalidades de los hongos de importancia médica

Ubicación de los hongos en la clasificación general de los seres vivos

Dominio: Eukarya.

Reino: FUNGI (Reino de los hongos).

Filo/División: -Mycota.

Clase: -Mycetes.

Orden: -Ales.

Familia: -Aceae.

Género y especie: _ _ _ Dependende de cada hongo _ _ _

Clasificación taxonómica de los hongos

Fase asexual (anamorfa). Fase sexual (teleomorfa). Cambian la taxonomía del hongo.

Filos:

- Ascomycota:
 - Dermatofitosis.
 - Esporotricosis.
 - Cromoblastomicosis.
 - Eumicetoma.
 - Histoplasmosis.
 - Coccidioidomicosis
 - Paracoccidioidomicosis.
 - Candidiasis.
 - Neumocistosis.
 - Aspergilosis.
 - Microsporidiosis.
- Basidiomycota:
 - Malassezia.
 - Criptococosis.
- Zygomycota:
 - Zigomicosis (Cigomicosis).
 - Mucorales.

Importancia de los hongos en la vida humana

Alimenticios:

- Agaricus Bisporus.

Venenosos (por las toxinas):

- **Amanita muscaria.**
- **Amanita Phalloides.**

Alucinógenos:

- **Amanita Muscaria**
- Psilocibe Spp.

Medicinales:

- Penicillium Spp.
- Streptomyces Griseus.

Contaminantes:

- Coniophora Spp.

Biocontroladores:

- Fusarium.

Patógenos:

- **Aspergillus.**
- **Histoplasmosis**
- **Coccidioides**
- **Cryptococcus**

Morfología general de los hongos

Estructura celular de eucariontes

- Núcleo bien definido.
- Mitocondrias.
- Retículo Endoplásmico.
- Aparato de Golgi.
- Pared celular de Quitina y Glucanos.
- Ergosterol en la membrana celular.
- Aerobios estrictos (minoría facultativa)
- Quimiotróficos y heterótrofos.

Organismos unicelulares: LEVADURAS. Reproducción asexual.

Organismos multicelulares: MOHOS. Filamentosos, reproducción sexual y asexual.

Hifas verdaderas que forman filamentos. (Al conjunto de hifas se le llama micelio). Pertenecen a mohos, forman esporas o conidios,

- Función:
 - Vegetativas: Nutrientes.
 - Reproductivas: Esporas.
- Forma:
 - Candelabro fávico
 - Nodulares
 - Espirales
 - Pectíneo
 - Raqueta
 - Rizoide
 - Zarcillo
 - Estolón

Seudohifas: células elongadas. Gemaciones de la membrana de levaduras.

Macrofisionados: > 1 mcm

Microfisionados: < 1 mcm

Hialinos (sin pigmento).

Pigmentado.

Estructura de las hifas:

- Tabicadas:
 - Poro simple.
 - Microporos.
 - Doliporo.
 - Rodante.
- No tabicados (cenocítico).

Reproducción sexual y asexual

Asexual (Anamorfa)	Sexual (Teleomorfa)
Ascomycota	Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota
Por medio de conidios, forman esporas	Por medio de fusión sexual
Mitosis	Plasmogamia → Cariogamia → Meiosis
Tállica → Fragmentación de las hifas	Ascomycota → Una y otra espora
Blástico: Las hifas fértiles dan lugar a blastoconidios	Basidiomycota → A partir de una bolsa salen varias esporas
Endogenico → Formación de esporas	Zigomycota → Células mayor y menor se fusionan

Generalidades de micología médica

Campos de estudio

Micosis: Infección causada por hongos. Invasión de tejidos.

- Primaria: Puede causar enfermedad sin importar el estado inmunológico del paciente.
- Oportunista: Requiere de una disminución en la capacidad inmunitaria del paciente.

Micetismo: Intoxicaciones o envenenamiento causado por la ingestión de setas venenosas.

Micotoxicosis: Intoxicaciones causadas por la inhalación o ingestión de micotoxinas endógenas producidas por mohos, puede o no consumirse al hongo.

Hipersensibilidad: Reacción inmunitaria exagerada. Alergias.

Clasificación clínica de las micosis

Superficiales: Cabello y capas externas de la piel.

- Pitiriasis versicolor.

Cutáneas: Epidermis profunda y queratinocitos.

- Dermatofitosis.
- Candidiasis cutánea.

Subcutáneas: Dermis, tejido celular subcutáneo y músculo.

- Esporotricosis.
- Cromoblastomycosis.
- Eumicetoma.

Sistémicas (no oportunistas): Diseminado a diferentes órganos, por hongos primarios.

- Histoplasmosis.
- Coccidioidomycosis.
- Paracoccidioidomycosis.

Oportunistas: Diseminado a diversos órganos, en individuos susceptibles. (

- Candidiasis sistémica.
- Neumocistosis.
- Criptococosis.
- Aspergilosis.
- Zigomicosis.
- Microsporidiosis.

Conceptos básicos de micología médica

Dimorfismo: Capacidad de un hongo de adoptar una forma levaduriforme o filamentosa.


- El principal es el térmico:
 - Coccidioides Spp.
 - Sporothrix Spp.
 - Histoplasma Spp.
 - Paracoccidioides Spp.

Oportunismo: Capacidad de un hongo de provocar enfermedad solo cuando el sistema inmune se encuentra debilitado.



Pleomorfismo: En los métodos de cultivo; transformación irreversible de una cepa por exceso de carbohidratos o mutaciones cromosómicas.


Micosis superficiales

	Agente etiológico	Imagen	Epidemiología	Patogenia, patología y manifestaciones clínicas	Diagnóstico de laboratorio y diferencial	Tratamiento, prevención y control
Dermatofitosis	Microsporium - Canis (13%) - Gypseum - Gallinae - Nanum Macroconidios fusiformes con paredes gruesas, septos transversales, espículas. Pocos microconidios.	 Trichophyton	- Infección fúngica más común - Geofílicos: Tierra - Zoofílicos: Animales tiñosos - Antropofílicos: Humanos - Mundial - Climas tropicales y subtropicales - Climas cálidos y húmedos - Micosis más frecuente junto a candidiasis - Piel húmeda, cálida, grasosa - Incidencia máxima en días húmedos y cálidos - Hacinamiento y malos hábitos higiénicos - Uso de esteroides tópicos - Immunosupresión - Genética por el factor sérico - Diabetes mellitus - Fómites y contacto con suelo infectado - Persona a persona - Tiña de cabeza: Niños - Tiña de pie, ungueal y pie: Adultos - Ocupación: Militares, deportistas y nadadores - Dentro de las 10 dermatosis más frecuentes de consulta - Tiña de barba: Hombres adultos - Tiña de cuerpo: 50% tronco, 40\$ extremidades, 20% cara; común en hiperhidrosis o personas de largo tiempo sentados - Tiña inguinal; 3:1 mayor en hombres. Adultos de entre 20 y 30 años, con hiperhidrosis o con largos periodos sentados - Tiña pedis: 3:1 Y mayoritariamente en deportistas, nadadores y baños públicos - Onicomiosis: 2:1 favor hombres y 50% de los problemas de uñas - Subungueal: Distal, lateral, proximal - Blanca superficial - Distrofia total	PATOGENIA (Incubación de 7 a 15 días) Traumatismo de piel → Aumento de humedad, calor y cebo → Espora → Colonización - Queratinasas → Tropismo → Comensalismo → Reacción inflamatoria - Elastasas - Lipasas - pH alterado y ausencia de ácidos grasos MAINIFESTACIONES CLÍNICAS Y PATOLOGÍAS Tiña de cabeza/ Capitis (T. Tonsurans y M. C.) - Alopecia y placas pseudoalopecias, zona circular gris pálido, exfoliación, prurito, pelos cortos y escamas - Ectotrix: Vaina alrededor del folículo (por Microsporium) - Endotrix: Esporas en el interior del folículo (por Tonsurans) - Favo: Costras alrededor del folículo con puntillo rojizo, olor a moho o a ratón Querión de Celso o inflamatoria - Inflamación del cuero cabelludo y eritema; tumoración dolor, costras, pus Tiña de la barba (T. Rubrum, T. Verrucosum) - Zona maxilar y submaxilar - Placa eritemato-escamosa, prurito, vesículas - Placa de pseudoalopecia, pelos cortos, exudado purulento, impétigo secundario - Adenopatías retroauriculares y satélites Tiña del cuerpo (T. Rubrum, M. Canis) y mano - Centro exfoliativa claro en piel glabra - Borde enrojecido seco o con vesículas - Eritema, vesículas, prurito, escamas y borde activo limitadas, bordes definidos Tiña inguinal (T. Rubrum, E. Floccosum) - Lesiones secas y pruriginosas en el escroto que se propagan por pliegues y hacia posterior, eritemato-escamas con borde activo y costras pustulosas Tiña del pie (T. Rubrum) / Piel de atleta - Intertriginosa: Espacios interdigitales del pie. Prurito en los pliegues. Descamación y maceración. - Vesiculosa: Vesículas con líquido acuoso en las plantas del pie y a veces el dorso. Muchísimo prurito. - Hiperqueratósica: Planta ulcerada con hiperqueratosis - Crónica: despellejamiento, dolor, etc. Tiña de mano (T. Rubrum y M. Canis) - Palmas y dorso, vesículas, eritema, prurito, escamas Tiña ungueal (T. Rubrum) / Onicomiosis - Color amarillento. Fragilidad de uñas - Engrosamiento. Desintegramiento. Tiña imbricada / Tokelau: Placa en encaje - Placas generalizadas que se superponen Dermatofitides (reacción tricofítide) - Vesículas en cualquier parte del cuerpo (más común en las manos)	DIFERENCIAL - TCA: Alopecia areata, dermatitis seborreica, psoriasis - QC: Foliculitis decalvante, LES, impétigo - TB: Alopecia areata, foliculitis bacteria, carbunco, dermatitis seborreica, acne pustuloso, acné conglobata, impétigo, dermatitis por contacto - TCO: Granuloma anular, pitiriasis rosada, eccema numular, eritema anular centrífugo, lepra tuberculoide, impétigo costroso, dermatitis seborreica, derpatitis por contacto, pitiriasis versicolor, candidiasis - TI: Candidiasis, eritrasma, psoriasis invertida, dermatitis seborreica, liquen plano, liquen simple crónico del escroto, dermatitis por contacto - TP: Candidiosis, dermatitis por contacto, psoriasis pustulosa, queratólisis puntacta-plantar, hiperhidrosis, hiperqueratosis plantar, etc. - TM: Candisiosis, psoriasis, liquen plano, hiperhidrosis, etc. - TU: Otras micosis - TT: Tiña de cuerpo, eritema anular centrífugo, grnuloma anular, pitiriasis versicolor, etc. - TF: Foliculitis bacteriana, eccema seborreico, LES DE LABORATORIO Examen directo al microscopio con KOH al 15 o 20% de raspaduras de piel, uñas y cabellos - Macroconidios de paredes lisas, septadas, con ausencia de microconidios. E. Floccosum - Macroconidios de paredes rugosas y microconidios. M. Canis - Macroconidios multicelulares y microconidios unidos a hifas de sostén. T. Rubrum - Ectotrix forma vainas de esporas - Endotrix forma vainas en el interior del cabello Biopsia con PAS o Grocott Cultivos en SDA a 25 °C con o sin antibióticos o IMA una o tres semanas a temperatura ambiental - Colonia vellosa blanca con reverso rojo vino (T. Rubrum) - Colonia vellosa blanco con amarillo (M. Canis) - Colonia aterciopelada blanco beige Luz de Wood (365 nm) - Aspecto amarillo-verdoso fluorescente PCR Intradermoreacción con Tricofitina 1:2,000 28 horas, se revisa si es positiva	Tópico para infecciones que no afectan pelo y uña, generalmente por 2 a 4 semanas - Clotrimazol (en especial en tiña del cuerpo y pue) - Terbinafina (en especial en tiña ungueal) - Bifonazol-urea en uñas Sistémico - Griseofulvina VO (en especial el tiña de la cabeza) 10-20 mg/kg/día por 40 días - Itraconazol VO (en especial en tiña del cuerpo y pie) 200 mg/día por 3 a 4 mese; - Fluconazol VO 150 mg/semana por 30 a 40 semanas; 300 mg/semana por 20 semanas - Terbinafina VO 250 mg/día por 3 a 4 meses Otras medidas - Conservar secas las lesiones - Impedir el contacto con fómites o personas o animales - Extracción quirúrgica de uña en tiña ungueal Profilaxis - Higiene personal buena - No hacinamiento - Revisión periódica de animales domésticos - Uso de calzado en lugares públicos con humedad - Uso de talcos



Malassezia	Malassezia Globosa Malassezia Furtur Malassezia Sympodialis Malassezia Restricta Malassezia Pachydermatis		- Microbiota normal de la piel cabelluda y piel - Mayormente en tórax, espalda superior, brazos y abdomen - Muy frecuente en costas - Máxima incidencia 18 y 25 años - Climas tropicales y húmedos - Uso de cremas, bronceadores grasos - Uso de corticoesteroides - Falta de higiene - Embarazo - Dermatitis seborreica dentro de las dermatosis más frecuentes	PATOGENIA - Lipodependencia → Microbiota de la piel - Lepra - Lipasas - Fosfolipasa MANIFESTACIONES CLÍNICAS Pitiriasis versicolor - Manchas hipo- (piel morena) o hiperpigmentadas (piel blanca) con escama y borde irregular - Manchas serpentinadas y aisladas - Manchas combinadas; Pueden dar Tokelau - Descamación e inflamación mínimas - Raro: pápulas o vesículas - AUSENCIA DE PRURITO Dermatitis seborreica (M. Restricta) principalmente en piel cabelluda (Caspa) - Inflamación - Eritema y escama - Asintomática; SIN PRURITO	DIFERENCIAL - Pitiriasis alba - Lepra - Vitiligo - Melasma facial LABORATORIO Examen directo con KOH al 10% de piel infectada - Hifas cortas no ramificadas y células esféricas (imagen de espagueti con albóndigas) Cultivos SDA - Colonia cremosa blanco amarillenta Luz de Wood - Fluorescencia amarillo-verdosa característica	Tópica para PV - Sulfuro de selenio - Solución yodada Sistémica para PV - Ketoconazol 200 mg/día por 7-15 días - Itraconazol 200 mg/día por 5-10 días - El objetivo es reducir el número a comensalismo



Micosis subcutáneas

	Agente etiológico	Imagen	Epidemiología	Patogenia, patología y manifestaciones clínicas	Diagnóstico de laboratorio y diferencial	Tratamiento, prevención y control
Esporotricosis	Sporothrix Schenckii Sporothrix Brasiliensis Sporothrix Globosa - Dimorfismo - Ambiental: Moho, infectante - Corporal (37 °C): Levadura		- Distribución mundial - Principal micosis subcutánea mundial - Segunda en México - Regiones tropicales y subtropicales, climas templados y húmedos - América del norte, central y sur - Tierra rica en plantas y tierra - Traumatismo cutáneo - Contacto con plantas (pantanos, rosales, pino, praderas, madera en putrefacción) y traumatismo al aire libre - Trabajos agrícolas, suelo rico en detritus vegetal, madera, hojas y ramas, musgo, etc. - Hombres 3:1 Mujeres, jóvenes - Zoonosis → animales domésticos - Campesinos agrícolas, jardineros - Visitas rurales	PATOGENIA - Traumatismo cutáneo → Inoculación de conidios o hifas, adhesión epitelial - Dimorfismo térmico, termotolerancia - Inhalación de esporas (raro) - Ureasa, peroxidasa, fosfatasa, etc. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PATOLOGÍA Linfocutánea (Linfagitis) (70-75%) - Lesión papulonodular (nódulo granulomatoso) → Ulcera → Verrugas - Siguen vasos linfáticos, los engrosan - Nódulos secundarios (satélites) subcutáneos y abscesos Fija (25%) - Un solo nódulo, circunscrito y menos progresivo (Chancro esporotricósico) Pulmonar (98% asintomática) - Tos discreta Generalizada - Lesiones diseminadas	DIFERENCIAL - LC: Tuberculosis, sífilis, Micetoma, Tularemia, Cromoblastomycosis - CF: Cromoblastomycosis, impétigo, micobacterias, LES - P: Neumonía, tuberculosis, aspergilomas LABORATORIO Cultivo SDA a 25-30 °C (estándar de oro) - Macroscópica: Colonia levaduriforme blancas o beige - Microscópica: Hifas delgadas con gemación de esporas en forma de flor de margarita Examen directo con KOH de muestras de biopsia o lesión - Levaduras multigemantes, cuerpo asteroide Examen con tinción de PAS o H&E o Grocott - Levadura alargada o cuerpo asteroide, zona con PMN, granuloma y tercer zona Serología - IDR con 1:2,000 a los 5 o 10 minutos con eritema y prurito, máx. 48 horas	- Itraconazol VO 3 a 6 meses 200-300 mg/día - Itraconazol VO y AMB en enfermedad diseminada 0.27-0.75 mg/kg/día - Yoduro de potasio en leche VO (pocos la toleran) - Calor local - Criocirugía
	- Fonsecae Pedrosoi - Phialophora Verrucosa - Rhinocladiella Aquaspera - Fonsecae Compacta - Cladophialophora Carrionii - Cladosporium - Exophiala Células muriformes se reproducen por fisión binaria		- Trópicos y subtropicales - Vegetación y tierra, en especial en paja, hierbas, espinas, palmeras, etc. - Climas húmedos y cálidos - Granes lluvias - Trabajadores agrícolas descalzos (leñadores, campesinos y granjeros) 20 y 40 años 4:1 mayoría hombres - Miembros inferiores (75%). - Miembros superiores (20%) - Clínica: nodular, tumoral, verrugosa, placa, cicatricial	PATOGENIA - Traumatismo → Inoculación - Dimorfismo, hidrofobia, termotolerancia - Adhesinas, melanina, Sideroforos, enzimas MANIFESTACIONES CLÍNICAS Habitual - Lesión de coliflor con lesiones satélites y abscesos con costras; úlceras pequeñas con material hemopurulento, puntos negros, costras, etc. Prurito y dolor (verrugas con extensión de los linfáticos de la zona) y lesiones satélites Raro: elefantiasis por infección secundaria, obstrucción y fibrosis Diseminación (raro)	Cultivo - Colonia pardo oscuro o negro aterciopelada con arrugas P. Verrucosa: Conidios con fialidas en forma de florero F. Pedrosoi: Cadenas ramificadas cortas de blastoconidios F. Compacta: Blastoconidios esféricos. R. Aquaspera: Conidios terminales de célula en alargamiento. C. Carrionii: Cadenas ramificadas de conidios por gemación distal. Examen directo con KOH al 20-40% por raspaduras - Cuerpos muriformes o cuerpos escleróticos con tabicación transversal (patognomónico) Biopsia - Granuloma con hiperplasia extensa de dermis y CM	- Extirpación quirúrgica de la lesión pequeña - Criocirugía - Vitamina D2 - Flucitosina en lesiones de gran tamaño 100 mg - Itraconazol en lesiones de gran tamaño - Terbinafina - Calor local


Eumicetoma	• Pseudallescheria Bordii / Scedosporium Apiospermum • Madurella Mycetomatis • Madurella Grisea • Exophiala Jeanselmei • Acremonium Falciforme • Pseudallescheria Boydii • Phaeoacremonium • Fusarium • Curvularia		• Mayoritariamente en miembros inferiores y manos • Trabajadores agrícolas descalzos • Principal micosis subcutánea en México, zona centro norte • Zonas de lluvia • Espinas de acacias • 3/4:1 favor hombres • 20 a 50 años • Campesinos, pastores, obreros, mecánicos, etc. • No uso de zapatos cerrados • 60% miembros inferiores • 30% en el pie • México 19% en espalda y nuca • Padecimientos de años de evolución	PATOGENIA • Traumatismo → Inoculación por tierra contaminada MANIFESTACIONES CLÍNICAS • Evolución lenta • Inflamación crónica con fibrosis con aumento de volumen de la región • Supuración, abscesos • Granulomas y fistulas húmedas con gránulos, exudado seropurulento filante • Exudado con granos de 3 a 5 mm • Deformación con edema y pérdida de función • Osteolisis, periostitis, osteítis, osteofibrosis • Puede haber meningitis, daño de órganos, etc.	DIFERENCIAL • Osteomielitis, tuberculosis, esporotricosis, Coccidioidomicosis, actinomicosis, feohifomicosis, forunculosis, etc. LABORATORIO Biopsia • Hifas Examen directo con KOH al 10% • Granos de eumicetos, negros, micelio y conidios Cultivo en SDA • Biopsia • Granuloma crónico supurativo con infiltrados de PMN, y granos con hifas PCR Radiografía	• Desbridamiento y/o extirpación quirúrgica y quimioterapia Tópicos para P. Boydii • Nistatina • Miconazol Infección por Madurella • Itraconazol • Cetoconazol • AMB Infección por E. Jeanselmei • Flucitosina Prevención por uso de calzado y limpieza de heridas
------------	--	--	--	--	--	--



Micosis sistémicas de inicio pulmonar






Agente etiológico	Imagen	Epidemiología	Patogenia, patología y manifestaciones clínicas	Diagnóstico de laboratorio y diferencial	Tratamiento, prevención y control
Histoplasmosis	 	• H. Capsulatum (pulmonar y diseminada) Valles de Ohio, Misisipi, México y América central y sur • H. Duboisii (cutáneas y óseas) África • Suelos con alto nivel de nitrógeno, guano de murciélagos y aves • Minería o trabajo en cuevas, cavernas y casas abandonadas • Demolición de viviendas y construcción en áreas endémicas • Mayor síntomas en inmunosuprimidos • Micosis pulmonar más frecuente Centroamérica • México centro sur y noreste, el sureste es el más endémico • Mayor incidencia en verano • Mayormente entre 20 y 40 años • 3:1 favor hombres • 25% mayor susceptibilidad en gente blanca • Para forma diseminada o crónica: Corticoterapia, leucemias, linfomas, alcoholismo crónico • VIH-SIDA con <150 CD4/mm³ es causa de enfermedad diseminada, DETERMINANTE	PATOGENIA (Incubación de 1 día 5 meses) • Pulmonar (95%): Inhalación de esporas o conidios → Se transforman en levaduras y fagocitados • Cutánea (0.5%): Inoculación de esporas por traumatismo • Intracelular facultativo → Diseminación al sistema reticuloendotelial • Polimorfismo genético (13 cariotipos) • Dimorfismo. Intracelular, anemófilo • Melanina, entrecruzamiento • Ureasa, peptidasa, proteasa, glucanos • Termotolerancia MANIFESTACIONES CLÍNICAS • Asintomática (95%) Pulmonar primaria leve (seudogripal) • Fiebre moderada, escalofríos y dolor torácico, astenia y adinamia • Mialgia, cefalea, tos no productiva • Enfermedad pulmonar aguda (duración de 10 días) Pulmonar moderada • Tos, estertores, disnea discreta, mialgias • Fiebre moderada constante, cefalea • Artralgia, gonartrosis • Hipersensibilidad en tiempo posterior Pulmonar grave • Tos con expectoración mucoide, hemoptisis, disnea, fiebre aguda, diaforesis, cianosis • Estertores crepitantes, sibilancias • Malestar general, astenia, cefalea intensa • Diarrea* Primaria cutánea (0.1%) • Chancro con linfagitis y adenitis • Paniculitis, nodulares, gomosas-ulceradas SIDA → Diseminada fulminante (corazón*) • Linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, fiebre alta, anemia, pérdida ponderal, pancitopenia, pápulas que dan lugar a verrugas	DIFERENCIAL • PA: Coccidioidomicosis, blastomicosis, neumonía bacteriana • PC: Tuberculosis, micobacterias, Coccidioidomicosis, Paracoccidioidomicosis • HP: Nódulo de Ghom, aspergilomas, coccidioidoma, etc. • HD: Criptococosis, blastomicosis, etc. LABORATORIO Examen directo de esputo, orina, raspaduras de lesiones, aspiración de médula ósea y capa leucocítica con PAS, Grocott, Gomori, etc. • Levaduras intracelulares en PMN y MMN Biopsia de tejido con PAS o Giemsa • Macrófagos con células ovoides en su interior Serología • Positivo a las 2 o 5 semanas Detección de antígenos en suero PCR Cultivo SDA a 25-30 °C: • Colonia vellosa, surcada, seca A y B • Macroconidios espiculados o equinulados y microconidios sésiles • 37 °C colonia levaduriforme (diferencial) Intradermoreacción con Histoplasmina: • Positiva y persistente en pulmonar leve y moderada • Negativa en histoplasmosis progresiva diseminada • Hiperreactividad en formas cutáneas Radiología: • Linfadenopatías hiliares e infiltrados y/o nódulos pulmonares • Pulmonar moderada: aumento de volumen de los ganglios linfáticos hiliares • Pulmonar grave: Nódulos diseminados, adenopatías hiliares, lesiones cavitarias, derrame pleural • Histoplasmosomas residuales con calcificación tras años; más de 3 cm de diámetro, más frecuente en lóbulos inferiores con lesiones satélites calcificadas	• Pulmonar leve: Itraconazol • Moderada y grave: AMB IV 0.25-1 mg/kg/día de elección; e Itraconazol VP 200-400 mg/día • Fluconazol en segunda línea 200 a 400 mg/día • Progresiva: Sulfametoxidiazina 20 mg/kg/día por 1 a 2 años • Prevención con uso de mascarillas, humedecimiento de tierra de construcciones, etc.


Coccidioidomycosis	Coccidioides Immitis Coccidioides Posadasii • Esférula con endosporas (forma levaduriforme); Forma parasitaria • Arthroconidios (forma filamentosa); forma infectante Mesófilo Patógeno primario Antígenos • Coccidioidina (C. Immitis) • Esferulina	 	• Norte de México, suroeste de EUA, Centroamérica y Sudamérica. Endémicas • Lluvias • Meses secos de Verano y Otoño • Arena de desiertos • No hay transmisión persona a persona • Mayor frecuencia en meses cálidos • Suelos pobres y sin competencia fúngica • Mayor incidencia en edad adulta • Niños con mayor diseminación • Hombres 4:1 mujeres • Ocupacional: Campesinos, mineros, albañiles, soldados, deportistas del desierto, inmigrantes • Dentro de las 10 enfermedades que se adquieren en el trabajo de laboratorio	PATOGENIA (Incubación de días a meses) • Inhalación de esporas o arthroconidios → Pulmonar (95-98%) • Traumatismo con inoculación de esporas → Cutánea • Dimorfismo, melanina, biótico • Sideróforo Fe⁺⁺, Anemófilo • Ureasa, Elastasa, Colagenasa • Termotolerancia, hidrofóbico MANIFESTACIONES CLÍNICAS Primaria pulmonar asintomática (60 a 75%) Primaria pulmonar sintomática (25 a 40%) “Fiebre del Valle”: • Fiebre, malestar general, tos, hemoptisis, artralgias, cefaleas; eritema nudoso o polimorfo eritemato-violáceas, adenopatías • Hipersensibilidad tras resolución: Eritema nudoso o multiforme Primaria cutánea • Chancro con linfagitis y adenitis Primaria residual • Sintomatología leve o ausente Pulmonar persistente (neumonía) • Aguda: Fiebre, dolor torácico, tos productiva purulenta, hemoptisis • Persistente: Infiltrados por 6 semanas • Progresiva: Por décadas • Fibronodular: Hemoptisis intensa • Cavitaria: Fiebre, tos, hemoptisis • Nódulos: 2 a 4 cm • Adenopatías hiliares y mediastinales • Miliar: Fiebre alta constante, hepatomegalia, esplenomegalia Meningitis • Cefalea intensa, fiebre, parálisis, desorientación Cutánea secundaria • Lesiones no dolorosas con fistulas Diseminación en pacientes inmunosuprimidos, ancianos, embarazadas y etnias específicas. Grave • Piel, articulaciones, huesos, SNC	DIFERENCIAL • PP: Influenza, neumonía atípica, bronquitis, tuberculosis, Paracoccidioidomycosis e histoplasmosis • PR: Tuberculosis, histoplasmosis, blastomycosis residual y Paracoccidioidomycosis • CP: Esporotricosis, blastomycosis, Paracoccidioidomycosis, Tularemia, Micetoma, osteomielitis bacteriana, infección por micobacterias no tuberculosas • G: Blastomycosis y esporotricosis diseminada LABORATORIO Examen directo con KOH al 20% de esputo, exudado, LCR, sangre, orina y tejido • Esférula con endosporas (Patognomónico) Biopsia de tejido con H&E, PAS, etc. • Esférula de pared gruesa doblemente refráctil con endosporas Cultivo (rápido) SDA a 25-28 °C en BS III • Colonia algodonosa blanca o bronceada • Hifas con Arthroconidios Serología • IgM contra Coccidioidina a las 2 o 4 semanas • IgM 1:32 diseminación • Complemento 1:64 diseminación ELISA PCR Radiografía: • Adenopatía hiliar, con infiltrados pulmonares, neumonía, derrame pleural y/o nódulos Intradermoreacción (0.1 ml de solución con Coccidioidina) 1:100 • >5 mm de diámetro en 24 o 48 horas → Positiva • Negativa si es diseminada • Reacción cruzada contra otros hongos Examen de LCR • Aumento de densidad, turbio, celularidad, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia	Enfermedad primaria no requiere tratamiento Enfermedad grave o factores de riesgo • Primera elección: ◦ AMB IV 0.25 mg/kg acada tercer día por goteo lento por 5 a 6 horas máximo 30 o 50 mg por 2 o 3 semanas (Administrar anti-H1 y analgésico 1 hora antes) con vía en Y, con heparina ◦ Ketoconazol 200-400 mg/día ◦ Itraconazol 200 a 200 mg/día ◦ AMB IV con Fluconazol VO en meningitis • Segunda elección: ◦ Fluconazol VO y AMB IV Profilaxis ◦ 1-cloro-2-nitropropano
Paracoccidioidomycosis	Paracoccidioides Brasiliensis • Patógeno primario • Hifas • Levaduras multigemantes Antígeno: • Paracoccidioidina		• Centro y Sudamérica • Sur de México • Zonas rurales y con suelo ácido • Zonas de siembra de café, algodón y tabaco • Zonas del alta precipitación • Agricultores, campesinos • Mayor incidencia de 30 a 60 años • 90% son hombres (13:1) • Trabajadores de áreas rurales • Susceptibilidad en genes HLA-A9, B13 y B40	PATOGENIA • Inhalación de conidios o mohos • Inoculación por traumatismos • Diseminación a piel, mucosas, vísceras • Dimorfismo térmico, anemófilo, pared • Melanina en los conidios, gp43 • Proteínas de unión Estrógenica • Proteasas, fosfatasa, proteína de anclaje MANIFESTACIONES CLÍNICAS Pulmonar • Aguda: Tos, hemoptisis, adinamia, astenia; hepatomegalia, esplenomegalia • Crónica: Tos, fiebre, expectoración Mucocutánea • Estomatitis muriformes, con ulceraciones, bordes irregulares con úlceras y lesiones hipertróficas; problemas para la deglución; lesiones nódulo-gomosas en la piel facial, vegetantes Ganglionar y visceral	DIFERENCIAL • PP: Tuberculosis, Coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis, neoplasias • PMC: Esporotricosis, Coccidioidomycosis, tuberculosis, blastomycosis, Leishmaniasis • PG: Tuberculosis, Coccidioidomycosis, blastomycosis, linfomas • PV: Histoplasmosis, blastomycosis, enfermedad de Addison • PSIDA: Histoplasmosis, sífilis secundaria, Criptococosis, micobacterias, Leishmaniasis LABORATORIO Examen directo de biopsia o lesiones con KOH al 10% o biopsia con PAS y Gomori-Grocott: • Levaduras multigemantes de pared refringente (rueda de timón) (Patognomónico) Cultivo con SDA a 28 °C: • Colonia blanca aterciopelada y pigmento marrón Radiología • Infiltrado nodular, fibrosis, cavitaciones; bilateral y basal; hifas septadas; sin conidios*	• Itraconazol 200-300 mg/día por 2 o 3 meses; seguida de 100 mg/día por otros 6 o 9 meses • Cetoconazol • TMP-SMX 160/800 mg/12 horas hasta la cura clínica y micológica • AMB 0.25-0.75 mg/kg/día

Micosis sistémicas causadas por oportunistas

	Agente etiológico	Imagen	Epidemiología	Patogenia, patología y manifestaciones clínicas	Diagnóstico de laboratorio y diferencial	Tratamiento, prevención y control
Candidiasis	Candida C. Albicans - Dimórfica, puede formar hifas verdaderas C. Glabrata C. Parapsilosis C. Tropicalis C. Krusei C. Dubliniensis C. Auris Morfología: - Microbiota de la piel, mucosas y TGI - Levaduras ovales - Forman Seudohifas - Candidina Condiciones de TODOS los hongos oportunistas: - Soportar >37 °C - Cambios bioquímicos - Cambio morfológico - Factores de virulencia propios - Contacto con huésped inmunodeprimido Condiciones del paciente para predisposición: - Enfermedades o procesos debilitantes - Inmunodeficiencias primarias o adquiridas - Factores iatrogénicos - Trasplantes (principalmente renal, hepático, corazón y médula ósea) - Cateterismo y nutrición parenteral		C. Albicans (mucosas, cutáneas, ungueales, cardiovasculares, profundas) más frecuente C. Glabrata (IVU) C. Parapsilosis (fungemia en pacientes con cateterismo) C. Tropicalis (Fungemia en neoplasias) C. Krusei (Fungemia) - Oportunistas - Principal micosis oportunista - Mucosas, piel húmeda y cálida - Se incrementa durante el embarazo - Neoplasias hematológicas malignas - Neutropenia - VIH-SIDA - Uso de antibióticos de amplio espectro - Traumatismos - Cirugía abdominal reciente - Niños prematuros - Lactantes por infección endógena - Entre 20 y 40 años esta la mayor incidencia - Ambos sexos - Genital, mayor en mujeres - Trabajos de mucho tiempo con las manos húmedas - Edad avanzada - Profilaxis con azoles en receptores de trasplantes o con neoplasia hematológica maligna C. Albicans principal agente de endocarditis infecciosa por hongos	PATOGENIA - Desequilibrio del organismo (cambios de pH; procesos debilitantes o enfermedades; inmunodeficiencias, etc.) → Fuente endógena → Multiplicación de levaduras → Invasión de tejidos → Infección superficial - Entrada al torrente sanguíneo ↔ Defensas bajas → infección sistémica - Catéteres, sondas, cirugía, drogas IV, broncoaspiración, traumatismo de mucosas → Candidemia - Adaptación al pH - Dimorfismo entre blastoconidios y Seudohifas o hifa - Adhesinas y formación de biopelículas - B-Glucanos: Induce Th17 - Aspartilproteinasa, Queratinasas, peptidasas, hemolisinas, proteasas, estereasas Hialuronidasa, Fosfolipasa (PLB1) - Switching fenotípico y apareamiento - Entrecruzamiento MTLa MANIFESTACIONES CLÍNICAS Oral: Glositis, gingivitis, periodontitis, estomatitis, placas pseudomembranosas blanquecinas con fondo eritematoso; hiperplásica cuando coloniza toda la lengua; quelitis si afecta labios Bucofaríngea: Lesiones pseudomembranosas blanquecinas y confluentes en lengua, labios, encías y paladar blando Vulvovaginitis: Irritación, prurito, secreción vaginal Balanitis: Eritema, micropústulas, erosiones, fisuras y leucoplasias Cutánea Intertriginosa: Similar a tiña, pero con lesiones satélites y ardor Onicomicosis: Hinchazón dolorosa y eritematosa del pliegue ungueal, perionixis/paroniquia con onicólisis y onixis Área del pañal: Prurito y ardor, similar a tiña Esofagitis: Disfagia, vómito, náusea, dolor y ardor, endoscopia con placa Gastritis: Rara* úlceras y placas Peritonitis por cateterismo o cirugía Enteritis: Diarrea Broncopulmonar: Tos con expectoración mucoide/gelatinosa Pulmonar: Tos con expectoración mucoide y sanguinolenta, disnea, dolor torácico, fiebre alta nocturna Pustulosis: lesión macronodular Mucocutánea crónica: Lesiones granulomatosas cutáneas que forman costras y queratitis, pseudomembrana blanquecina Endocarditis infecciosa: Alteraciones valvulares y formación de biopelículas Candidemia: Septicemia Meningitis: Fiebre, cefalea, rigidez y nuca, fiebre, hemiparesia, signos meníngeos positivos	DIFERENCIAL - O y BF: Estomatitis aftosa, herpes, geotricosis, Leucoplasia oral vellosa - VV: Trichomonas Vaginalis, G. Vaginalis, N. Gonorrhoeae, vaginosis bacteriana - B: Herpes, infección bacteriana - GI: Amebiasis, cryptosporidiosis, geotricosis, salmonelosis, shigelosis - BP: Tuberculosis, aspergilosis, criptococosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, sarcoidosis - I: Dermatitis por contacto, dermatofitosis - AP: Dermatoditis, dermatitis del área de P. - O: Tiña de uñas, infecciones por bacterias, líquen plano, psoriasis ungueal - PC: Foliculitis, acné, criptococosis, histoplasmosis - CM: Septicemia bacteriana y otras fungemias - EI: Infecciones bacterianas - IVU: Infección bacteriana - M: Criptococosis e infecciones bacterianas LABORATORIO Examen directo de lesiones, sangre, LCR, orina, exudado, catéteres y biopsia con KOH al 10 o 20% - Blastoconidios con Seudohifas y/o hifas - Se puede observar las películas Biopsia con PAS o Grocott - Proceso granulomatoso con blastoconidios y pseudohifas Cultivo a 37 °C en SDA o CHROM-Candida >1,000 colonias de hifas para IVU positiva C. Albicans: Verde claro C. Dubliniensis: Vede oscuro C. Krusei: Azul oscuro C. Tropicalis: Azul gris C. Parapsilosis: Blanco y/o sucio C. Glabrata: Rosa intenso C. Auris: Blanca rosada Prueba de antígenos Intradermorreacción 1:2,000 - Positiva con 5 mm de diámetro a las 48 horas PCR >90% de la sensibilidad y especificidad MALDI-TOF Determinación de mananos o B-1. 3-Glucanos Radiografía - Broncopulmonar: Se pueden observar engrosamientos - Pulmonar: Opacidades de parches con infiltrado general	Cutánea y mucosa - Itraconazol - Fluconazol - Miconazol - Caspofungina - AMB - Nistatina tópica Sistémica - Ketoconazol VO 200-400 mg/día por 10 días - Itraconazol VO 100-200 mg/día; vaginal por 5 días - AMB IV 0.25-0.75 mg/kg máx 1.5 mg/kg IV - Flucitosina - Fluconazol VO 100.150 mg/día - Voriconazol VO - Posaconazol VO - Caspofungina VO Profilaxis en alto riesgo


Neumocistosis	Pneumocystis Jirovecii • Microorganismo en transición • Carece de Ergosterol en la membrana celular • Escasez de orgánulos • Pobre desarrollo mitocondrial • B-Glucanos • B-Tubulina • ATPasa • Superóxido dismutasa Ciclo de vida: 1. Quistes 2. Esporozoitos 3. Esporozoito precoz 4. Esporozoito intermedio 5. Esporozoito tardío		• Mundial • Sobresale en México • Intrahospitalario • Inmunocompetente con portadores o presentan infección leve • El más frecuente en SIDA, marcadora • Neoplasias hematológicas y otras, trasplantes, alcoholismo, desnutrición y larga estancia hospitalaria • Mayor incidencia en hombres • Neumonía: VIH-SIDA <200 cel/mm³; niños <400 cel/mm³	PATOGENIA • Inhalación o hidratación → Inoculación MANIFESTACIONES CLÍNICAS Neumonía (95%) • Fiebre, tos seca, disnea, ortopnea • Hipoxia, alcalosis respiratoria moderada, aumento de DHL e inmunosupresión severa Neumonitis intersticial (sin SIDA) Ótica • Dolor, hipoacusia y otorrea; similar a otitis media bacteriana Oftálmicas • Placas blanco-amarillentas pos retinales, visión borrosa, disminución de la agudeza visual y fosfenos Diseminadas • Nódulos firmes, arenosos y necróticos • Diseminación a corazón y todos los órganos menos SNC	DIFERENCIAL • N: Tuberculosis, histoplasmosis, Coccidioidomicosis, blastomicosis, Criptococos, Citomegalovirus y micobacterias no tuberculosas • OT: Rinosporidiosis, otras infecciones virales y bacterianas • OF: Sarcoma de Kaposi, neoplasias y Citomegalovirus LABORATORIO Examen directo con Giemsa, azul de Toluidina, Gomori-Grocott (oro) etc. • Quistes de pared gruesa, esféricos o elípticos con 4 a 8 núcleos; morfología de panal de abejas • Exudado proteinico y fibrinoide intraalveolar con quistes (patognomónica) No se puede cultivar Serología • Inmunofluorescencia Biometría hemática: • Linfocitos T CD4 <400 células/ul • Alcalosis respiratoria • Aumento de DHL Radiografía de torax • Infiltrados difusos bilaterales, reticulares y nodulares TAC • Infiltrados difusos bilaterales, reticulares y nodulares	• Trimetoprim-Sulfametoxazol VO 80/400 o 160/800 mg/día por 21 días • Isetionato de Pentamidina IV • Profilaxis con TMP-SMX
Criptococosis	Cryptococcus Neoformans Cryptococcus Gattii • Levadura • Cápsula de polisacáridos ○ GXM 90% ○ GalXM 8% ○ MN 2% • Cápsula: CO₂, pH alcalino, y Fe⁺⁺ • Cápsula ausente en pacientes son SIDA • Se considera patógeno primario • Teleomorfa son Filobasidiella Neoformans y Bacillispora; producen basidioesporas		• Mundial • C. Gattii (regiones tropicales y subtropicales), mayoritariamente en África • 90% son producidas por C. Neoformans. • VIH-SIDA (90 a 95%) • Diabéticos • Neoplasias malignas • Corticoterapia • Linfomas, leucemias, sarcomas • LES • Tabaquismo • Frutas y leche no pasteurizada • Excremento de aves • Las aves son reservorios y vectores • Madera, arboles • Hombres 5:1 mujeres • Mayor incidencia entre 20 y 50 años • Mayores en blancos sajones • La variedad SNC es la más frecuente • Pulmonar: Asintomática (95%) • La meningitis a diferencia de las bacterianas por cocos, son subagudas o crónicas	PATOGENIA • Inhalación de basidioesporas o de levaduras → Diseminación al SNC • Traumatismo cutáneo → SNC • Tropismo por SNC y oportunismo • Cápsula de polisacáridos (antígenos [CrAg]): ○ GXM (90%) • Ureasa • Lacasa: Forma melanina • CD4 <100 cél/mm³ • Fosfolipasa, Sideróforo Fe⁺⁺ • Entrecruzamiento MATa, Switching MANIFESTACIONES CLÍNICAS Pulmonar • Leve (gripal): tos, fiebre y dolor pleural • Intensa: Fiebre constante, tos con esputo mucoide, hemoptisis, murmullo vesicular, estertores inconstantes SNC • Meningitis: Cefalea intensa frontal, dolor retroocular, fiebre leve constante, rigidez de cuello, Kerning y Brundzinski positivos; grave con vómito constante, delirio, alucinaciones • Meningoencefalitis: Coma • Criptococoma: Masa en forma de absceso con hemiplejía, hemiparesia, etc. Cutánea: • Papulares con úlceras y absceso; secundaria con nódulos y necrosis Ósea: Periostitis, osteofibrosis y Osteolisis Ocular: Papiledeema, uveítis, coriorretinitis Diseminada (corazón, hígado, TGI, próst. etc.)	DIFERENCIAL • P: Influenza, tuberculosis, neumonía, Coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, Paracoccidioidomicosis, candidiasis, neoplasias • SNC: Tuberculosis, neoplasias, toxoplasmosis, enfermedad degenerativa, meningitis bacterianas crónicas • C: Molusco contagioso, esporotricosis, acné, Coccidioidomicosis, Paracoccidioidomicosis • Os: Osteomielitis, osteosarcomas, etc. • Oc: Coroiditis, Mucormicosis, etc. • D: Tuberculosis, Coccidioidomicosis, blastomicosis, Paracoccidioidomicosis, histoplasmosis LABORATORIO Examen directo con tinta china de LCR, tejidos, exudado, esputo, sangre, orina y raspadura de piel: • Células en gemación con cápsula gruesa que no capta coloración Examen de LCR • Aumento de la presión • Presencia de células • Niveles bajos de Glucosa Cultivo de LCR en SDA a 37 °C • Colonia mucoide con aspecto de leche condensada Serología de LCR, orina y suero • Detección de GXM Radiología • Pulmonar: Infiltrados y lesiones solidas; moteado miliar difuso en cronicidad. Sin linfadenopatías hiliares ni afectaciones mediastinales... Criptococoma por C. Gattii es sumamente raro	• Inicial de AMB IV 0.7-1 mg/kg/día por 6 a 12 semanas; y con Fluconazol si es grave 800 mg/día VO • Consolidación con Fluconazol 400 mg/día por 8 semanas • Mantenimiento de Fluconazol 200 mg/día o Itraconazol por 6 a 12 meses • Tratamiento de VIH-SIDA con HHART

Aspergilosis	Aspergillus A. Fumigatus • Colonia plana, aterciopelada, verde o azul-verdosa con halo blanco sin pigmento • Conidióforo corto, liso y cenocítico, vesícula subclavia, fíalide uniseriada con ángulo de 180° y conidios redondos A. Flavus • Colonia plana, aterciopelada amarilla verdosa; puede* formar esclerotes • Conidióforo largo, rugoso, cenocítico, con vesícula esférica, fíalide uni o biseriada con ángulo de 360° y conidios equinulados A. Niger • Colonia plana, granulosa con inicio amarillo y final negro • Conidióforo largo cenocítico, vesícula subesférica, fíalide biseriada con ángulo de 360° y conidios subesféricos, negros y equinulados A. Nidulans • Colonia aterciopelada, color amarillo o verde amarillento con halo blanco • Conidióforo corto, vesícula subesférica, fíalide biseriada con ángulo de 140 a 180° con conidios esféricos y rugosos; células de Hülle A. Terreus • Colonia granulosa color beige-café con halo blanco • Conidióforo largo cenocítico, vesícula subesférica, fíalide biseriada con conidios redondos A. Candidus • Colonia aterciopelada blanca o amarilla pálida • Conidióforo largo cenocítico, con vesícula esférica o subesférica, fíalide biseriada a 140 a 180° con conidios esféricos A. Lentulus A. Clavatus y A. Versicolor	 A. Fumigatus  A. Flavus  A. Niger  A. Nidulans  A. Terreus  A. Candidus  A. Lentulus	• A. Fumigatus es el más frecuente • Primer micosis oportunista por hongos filamentosos • Segunda micosis oportunista más frecuente del mundo, después de Candida • Asociados a construcciones o demoliciones • Ubicuos • Primer hongo contaminante • Mundial • Intrahospitalario • Pulmonar y Onicomicosis: adultos • Hipersensibilidad: Adolescentes y jóvenes • Personas que manejan granos de alimentos • Linfocitos T CD4 menores a 50 células/mm³ son susceptibles a enfermedad invasiva • Desnutrición, tuberculosis, absceso hepático amebiano, alcoholismo crónico, carcinomas pulmonares, leucemias, linfomas, Corticoterapia • Hipersensibilidad: asma, fibrosis quística, enfermedad ocupacional • Aspergilosis pulmonar invasiva: tasa de letalidad del 95%	PATOGENIA • Inhalación → Proliferación → Formación de aspergilomas • Traumatismo cutáneo → Forma cutánea • Aumento de IgE, eosinofilia, sobreproducción de moco, Th2 CD4+ → Alergia • Forma de masa de micelio → Cobertura con membrana, fibrina, células y hongos → Aspergilomas • Inmunosupresión → Daño tisular → Invasión • Pulmón dañado → Diseminación MANIFESTACIONES CLÍNICAS Pulmonar Hipersensibilidad (aspergilosis alérgica) • Reacción asmática, rinitis, alveolitis • Infiltrados pulmonares y Eosinofilia • Tos, hemoptisis, disnea y fiebre • Hipersensibilidad cutánea I (inmediata) • Hipersensibilidad cutánea III (Arthus) Aspergilomas • Germinación en cavidad existente • Algunos asintomáticos • Síntomas: Tos, disnea, pérdida de peso, fatiga, hemoptisis, malestar general Enfermedad invasiva • Invasión de los vasos sanguíneos → Lisis tisular, infartos, trombosis y necrosis • Neumonía: tos constante, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, fiebre moderada persistente, dolor pleural, disnea, astenia, adinamia • Abscesos • Lesiones necróticas Rinosinusitis • Sinusitis unilateral (80%) o bilateral (20%) • Descarga purulenta • Descarga retronasal Cutánea • Pápulas eritematosas • Placa purpura • Hemorragia • Áreas necróticas • Onicomicosis: Similar a tiña ungueal, pero progresa a tonalidades verdosas u oscuras • Micetoma: Similar a Eumicetoma Diseminación al corazón • Valvulopatías • Endocarditis • Miocarditis • Posible pericarditis • Trastornos de la conducción Diseminación al TGI, riñón, bazo, hígado, SNC • Granuloma, trombosis, necrosis	DIFERENCIAL • H: Otras reacciones de hipersensibilidad a hongos o al polen • A: Neoplasias, Histoplasmosomas, criptococomas, mucormicomas, geotricomas • PI: Coccidioidomicosis, histoplasmosis, Mucormicosis, tuberculosis miliar • C: Mucormicosis cutánea primaria, micobacterias, dermatosis facticia, loxoscelismo, úlceras de cocaína • O: Tiña ungueal y otras infecciones • D: Kala-azar, histoplasmosis, blastomicosis, Coccidioidomicosis • SNC: Criptococosis, meningitis bacteriana LABORATORIO Examen directo von KOH al 10% de esputo, LBA y biopsia: • Hifas septadas, ramificadas, hialinas con conidióforos largos con vesículas terminales (cabezas aspergiliares) con ramificaciones dicotómicas • Aspergilomas: Masas de hifas de aspergillus • Invasiva: Cabezas raras, pero las hifas se ramifican a 45° y son septadas y gruesas • Cutánea y ungueal: Hifa delgada, tabicada y hialina Biopsia: • Granulomas, necrosis y con hifas características • Infiltrados, necrosis, trombosis, infartos e hifas en forma pulmonar invasiva Cultivo en 2 a 5 días en SDA o PDA sin antibióticos • Colonias variadas • Medio de Czapek: • Microscopía con cabezas aspergiliares Serología • IgE elevado en hipersensibilidad • IgG elevada en aspergiloma • IgG e IgE normales o bajas en invasiva ELISA RIA Detección de glucanos y galactomananos PCR MALDI-TOF Radiología • Aspergiloma: Signo de Monod (media luna) o signo del halo (halo radiolúcido que rodea una opacidad) predominante mente en el lóbulo superior con mayor frecuencia en el pulmón derecho • Invasiva pulmonar: Lesiones nodulares con signo de Monod positivo TAC • Rinosinusitis: área hiperdensa heterogénea Histopatología • Rinosinusitis: Bola fúngica, con membrana mucosa	Alérgica; • Loratadina • Desensibilización inmunológica • Prednisona • Azoles o equinocandinas* Pulmonar: • Corticosteroides* • Azoles Aspergilomas: • AMB IV 0.25-0.75 mg/kg/día máximo 3 a 6 en L-AMB e Itraconazol 200-400 mg/día VO • Cirugía • Voriconazol Invasiva: • Voriconazol inicial 6 mg/kg/día en 2 dosis si es IV con mantenimiento de 4 mg/kg/día en 2 dosis • Voriconazol inicial 200 mg/día en 2 dosis VO y se puede incrementar a 4 mg/kg/día • AMB Diseminada • Posaconazol 800 mg/día o 600 mg/día con liberación prolongada • Caspofungina 70 mg/día inicial con mantenimiento de 50 mg/día o 30 mg/día en Insuficiencia hepática Onicomicosis • Itraconazol 200 mg/día por 3 a 4 meses Profilaxis con Voriconazol, Itraconazol o posaconazol • Retirar al paciente de los sitios contaminados
--------------	---	---	---	--	--	---

Zigomicosis	Rhizopus - Oryzae (arrhizus) - Microsporus - Homothallicus - Stolonifer Mucor - Racemosus - Circinelloides - Ramosissimus Rhizomucor - Pusillus - Miehei Lichtheimia - Corymbifera Cunninghamella - Bertholletiae Conidiobolus - Coronatus - Incongruus Basidiobolus - Ranarum		- Mundial - Mayor incidencia en EUA, México, India e Irán - Clima cálido y húmeda - Pan, trigo, cereales, etc. - Hombres 6:4 mujeres - Mayor incidencia entre 20 y 40 años - Inmunodepresión - Diabetes Mellitus 1 o 2 - Cetoacidosis diabética o acidosis metabólica - Leucemias, linfomas, Corticoterapia, quemaduras graves inmunodeficiencias, etc. - Micosis más aguda y de rápida progresión - Letalidad del 95% - Mucormicosis rinocerebral: Cetoacidosis diabética y uso de corticoesteroides - Mucormicosis pulmonar: Neutropenia y uso de corticoesteroides; normalmente es primaria, pero puede ser secundaria a la rinocerebral - Mucormicosis cutánea: Traumatismos, catéteres, inyección y maceraciones; su principal ubicación es el torax - GI: Malnutrición - Diseminada: Neutropenia, uso de corticoesteroides, uso de la deferroxamina, etc.	PATOGENIA - Espora → Mucosa nasal → Invasión de vasos sanguíneos → Trombosis, infarto y necrosis - Invasión de senos paranasales, ojos, huesos, cerebro → Lesión de vasos sanguíneos y nervios craneales - Paciente: Neutropenia, trombocitopenia, hiperglucemia, Cetoacidosis diabética, - Angioinvasión y adhesión epitelial - Evasión de la respuesta inmune - Reducción morfológica, termotolerancia y resistencia a antimetabólicos - Asimilación de Fe⁺⁺, cetona Reductasa - Calcineurina y cetona Reductasa MANIFESTACIONES CLÍNICAS Mucormicosis rinocerebral Rino-órbito-cerebral Rino-maxilar Mixta - Estadio 1: Sinusitis, edema periorbital unilateral, eritema y necrosis del tabique nasal, descarga sanguinolenta, cefalea intensa y disminución de la visión, Glasgow de 13 a 15 - Estadio 2: Extensión del edema, fistula en los párpados con exudado seropurulento fétido, midriasis, fijación pupilar, letargia, hiporreflexia corneal; necrosis del tabique nasal y posible ruptura, Glasgow entre 8 y 12, dolor de senos paranasales - Estadio 3: Aumento de la fistula y el edema, necrosis facial extensa, trombosis, infartos, disfunción de II, III, IV, VI, proptosis, midriasis, disminución de la agudeza visual, disfunción de V y VII, celulitis periorbitaria, oftalmoplejía, hipertensión, convulsiones, triada Rino-órbito-cerebral, Glasgow 3 a 8 - Edema facial, Exudado sanguinolento nasal y Celulitis orbitaria Pulmonar - Fiebre moderada, tos con expectoración, hemoptisis, disnea, dolor pleural Mucormicosis cutánea o subcutánea - Necrosis isquémica masiva - Escaras parduzcas o negras - Úlceras necróticas con exudado fétido - Dolor - Masa subcutánea de gran tamaño Mucormicosis TGI - Infarto enteral, fiebre moderada, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal intenso y difuso, melena y hematoquecia Diseminación al corazón: úlceras, microabcesos, necrosis, infarto, etc. Diseminación a piel, pulmón, etc. Secuelas - Parálisis facial - Perdida de ojo	DIFERENCIAL RC: Linfoma centrofacial, granuloma letal, rinoscleromas, sinusitis, conidiobolomicosis, infecciones por anaerobios P: Bronquitis, neumonía lobar o bronquial, aspergilosis invasiva, aspergilomas GI: Úlcera gástrica, basidiobolomicosis, amebiasis y salmonelosis C: Aspergilosis cutánea, gangrenas por micobacterias, osteomielitis bacteriana, infecciones por P. Aureginosa y Proteus, piodermas gangrenosos, loxoscelismo, etc. LABORATORIO Examen directo con KOH al 10 o 20% de exudados, secreciones nasales, esputo, LBA y heces; - Hifas cenocíticas, hialinas, anchas, desiguales, dicotómicas con ramificación de predominio de ángulo en 90° - Esporangios Cultivo con SDA a 25 o 28° - Colonias algodonosas, vellosas, blanco grisáceas Biopsia con PAS o Grocott: - Hifas gruesas, etc. Con edema, necrosis, PMN, células plasmáticas, Eosinófilos. Trombosis, infartos, invasión y reacción inflamatoria Radiografía: - Sinusitis con fistulas, Osteolisis - Pulmonar: Signo del Halo inverso e infarto PCR MALDI-TOF	- Desbridamiento quirúrgico intensivo - Oxigenación hiperbárica - AMB 0.25 a 0.75 mg/kg/día máx 1.5 mg/kg/día IV - Itraconazol 300 a 400 mg/día; se puede combinar con AMB - Deferasirox 20 mg/kg/día por 2 o 4 semanas; quelante de hierro

Microsporidiosis	Anncaliia A. Algerae A. Connori A. Vesicularum Encephalitozoon E. Cuniculi E. Intestinalis Enterocytozoon Bieni - Microsporidium M. Ceylonensis M. Africanum Características: - Ausencia de Golgi - Genoma pequeño - Túbulo polar (inyecta esporoplasma)		- Zoonosis - VIH-SIDA <100 CD4/mm³ - Diabetes, neoplasias malignas, trasplante, etc. - ETS*	PATOGENIA - Inhalación de esporas - Intracelular estricto → Nuevas esporas - Atrofia, hiperplasia, infiltración e inflamación, necrosis y erosión MANIFESTACIONES CLÍNICAS Inmunocompetente - Diarrea acuosa autolimitada Inmunodeprimido - Diarrea crónica líquida pastosa - Pérdida de peso, malabsorción - Hepatitis, colangitis, colecistitis - Pancreatitis - Peritonitis (SIDA) - Queratitis y sinusitis - Rinosinusitis, IVU, IRS, ISNC - Sistémica	Microscopía con identificación de esporas - MET o MEB de organismo flagelado polar - ML es el estándar de oro con Gram, Giemsa, etc. PCR	- Albendazol para E. Intestinales. - Fumagilina contra E. Bieni. - HAART para el VIH-SIDA

Otras patologías

Agente etiológico	Imagen	Epidemiología	Patogenia, patología y manifestaciones clínicas	Diagnóstico de laboratorio y diferencial	Tratamiento, prevención y control
Hipersensibilidad Ascomycota no infectantes - Stachybotrys - Cladosporium - Fusarium Levaduras - Candida Albicans - Malassezia Spp. - Trichosporon Spp. - Aureobasidium Pullulans		Síndrome del edificio mal ventilado → Humedad → Mohos contaminantes	PATOGENIA - Esporas, conidios, mohos con antígenos de superficie → Aparato respiratorio → Reacciones de hipersensibilidad - HI: IgE asociada a MMN - HII: IgG o IgM preformados - HIII: Complejos, Ig's → Daño tisular - HIV: Células citotóxicas - Puede ser por primo contacto o por condición previa MANIFESTACIONES CLÍNICAS - Rinitis - Asma bronquial - Alveolitis alérgica extrínseca (tos, fiebre, expectoración, disnea; fibrosis pulmonar) - Neumonitis generalizada Fenómeno Ides - Descamación y eritema Coccidioidomycosis - Tipo IV, ausencia del hongo con eritema nodoso y polimorfo	LABORATORIO - Determinación de IgE específica contra antígenos sospechosos - Pruebas de sensibilidad cutánea - Telerradiografía de torax - TAC - Espirometría	- Evitar el alérgeno - Corticoterapia - Desensibilización con fungicidas o filtros - Demolición de edificios infestados - Antihistamínicos H1 (Loratadina) - Broncodilatadores (Salbutamol) - Esteroides (Dexametasona)
Micotoxicosis Aspergillus - Flavus - Parasiticus - Nomius - Ochraceus - Alliaceus - Osteanus - Versicolor - Tamarii Penicillium - Viridicatum - Rubrum - Camemberti - Oryzae - Patulum - Griseofulvum Fusarium - Tricinatum - Poae - Nivale - Graminearum - Verticilloides - Oxysporum		- Condiciones de toxinas 20 a 42 °C - pH 4 a 8 - Humedad 90% - Primaria: Vegetal - Secundaria: Derivados - Aflatoxina (cereales, especias, nueces y semillas oleaginosas) - Ocratoxina: Alimentos y bebidas - Patulina: Manzana - Tricotenos: Trigo, avena, cebada - Zearalenona: Maíz, trigo, etc. - Desoxinivalenol: Cerdos - Fumonisin: Maíz - Ergotamina: Frutas, centeno	PATOGENIA - Ingestión de micotoxinas MANIFESTACIONES CLÍNICAS Aspergillus - Aflatoxina B1, B2, G1 y G2 → Hepatotoxicidad (fiebre, vómito, dolor abdominal, anorexia, ictericia, diarrea) - Ácido ciclopiazónico → Neurotóxica - Ocratoxina: Hepatotóxica y abortiva Penicillium - Viridiotoxina → Enteritis - Rubratoxina → Hemorrágica renal y hepática - Patulina → Neurotóxica y Neumotóxica Fusarium - Tricotecenos, Fusarina T-2, Fusarina HT-2 DAS → Neurotóxica, Carcinógena, Gastrotóxica, ATA - Butenolida → Neurotóxica y Gastrotóxica - Fumonisin → Neurotóxica, Gastrotóxica, Neurotóxica - Zearalenona → Estrógena y abortiva - Desoxinivalenol → Gástrico (náusea y vómito) con anorexia y neurotóxica - Fumonisin → Neurotóxica, Gastrotóxica, Neumotóxica. Cardiotoxicidad Claviceps Purpurea	Antecedentes alimentarios y socio-alimentarios Demostración de toxina en alimento - ELISA para demostración de toxinas - Biomarcadores	- Inspección de suelos, cereales y otros alimentos - Almacenamiento fresco - Comer los alimentos cuanto antes - Diversificación de la dieta - Ochrarhone - Dieta de carbón para reducir absorción de toxinas

	• Acuminatum • Avenaceum • Claviceps Purpurea • Alternaria Spp.			• Ergotoxina → Neurotóxica y vasoconstricción • Ergotamina → Vasoconstricción, gangrena, neurotóxica		
Micetismo	Amanita • A. Phalloides • A. Verna • A. Virosa • A. Muscaria • A. Pantherina • A. Ibotengutake Lepiota • Helveola • Aspera Cortinarius • Sanguineus • Orellanus Psilocybe • Mexicana • Cubensis • Zapotecorum • Aztecorum Helvella • Esculenta Russula • Subnigricans Boletus • Luridus Tricholoma • Equestre Clitocybe • Amoenoletus • Clavipes Hapalopilus • Rutilans Pleurocybella • Porrigens Grifola • Frondosa Pleoturus • Eringii Gyromitra • Esculenta Lactarius Rinoboletus, Acromegalia, Inocybe, Cholophyllum Bloetus, Entoloma, Omphalotus, Paxillus, Corinus, Verpa Bohemica, Pholiota Squarrosa, Cortinarius, etc. Spp.		• Identificación errónea del hongo • Intento de suicidio • Búsqueda de alucinógenos • Síndrome colinérgico: Inocybe, Clitocybe, Boletus, Rubinoboletus, Amanita Muscaria, Amanita Pantherina • Síndrome epileptogénico: Gyromitra Esculenta; 10% letales • Síndrome glu/GABA: Amanita Muscaria, A. Pantherina y A. Ibotengutake • Síndrome encefalopático: Hapalopilus Rutilans, Pleurocybella Porrigens, Grifola Frondosa, Pleurotus Eringii, Anamita Phalloides, Gyromitra Esculenta • Síndrome alucinógeno: Psilocybe Mexicana, Psilocybe Cubensis, Psilocybe Zapotecorum, Psilocybe Aztecorum, • Toxina neurovasculares: Clitocybe Amoenoletus y Acromegalia • Gastroenteritis y gastritis: Cholorophyllum, Boletus, Entoloma, Lactarius, Omphalotus, Clitocybe, Paxillus y Tricholoma, Russula • Disulfiram: Corinus Spp, Lepiota Aspera, Boletus Luridus, Verpa Bohemica, Clitocybe Clavipes, Pholiota Squarrosa y Tricholoma Equestre • Hepatotoxicidad: Amanita Spp y principal causa de muerte • Nefrotoxicidad: Cortinarius Spp • Miotoxicidad: Trichoma Equestre, Russula Subnigricans, Cortinarius • Sanguíneo: Helvella Esculenta • Síndrome Parafaloideano: Lepiota Helveola, Cortinarius Sanguineus, Cortinarius Orellanus • Síndrome Faloidiano: Amanita Phalloides, Amanita Verna, Amanita Virosa	• Síndrome colinérgico (muscarina y muscardina): Enrojecimiento, vasodilatación, diaforesis, lagrimeo, miosis, visión borrosa, dolor abdominal, temblor, asistolia, hipotensión, síncope, choque • Síndrome epileptogénico (Gyromitrina): Vómito, diarrea, ataxia, convulsiones y coma • Síndrome glutaminérgico / gabaminérgico (ácido iboténico y muscimol): Vómito con alternancia depresiva o excitadora del SNC • Síndrome encefalopático (ácido polipórico): Náusea, cómito, dolor abdominal, neurológicos • Síndrome alucinógeno (Psilocibina y Psilocina): Alucinaciones y alteraciones de la orientación • Toxina neurovasculares (ácido acromático y análogos de kainato): parestesias, eritromegalia • Cardiotoxina y muerte súbita (Trogia Venenata) Náusea, vómito diarrea, dolor abdominal, fatiga, malestar torácico, mareos y convulsiones... (Amanita Franchetii y Proxima; Ramaria Rufescens): Náusea, vómito, mareo, dolor, espasmos musculares, temblores → Colapsos vasculares → Muerte • Gastroenteritis: Vómito, dolor, diarrea, y sangre • Efecto disulfiram: Cefalea, rubor, náusea, diaforesis, vomito, taquicardia, hipotensión, mareos y disnea • Hepatotoxicidad (Amatoxina) • Nefrotoxicidad (Orellana): Insuficiencia renal • Miotoxinas: Relajación muscular, IRA, miocardiotoxicidad, miocarditis, etc. • Sanguíneo: Hemólisis • Síndrome Parafaloideano (Parafaloideas): Toxicidad neurológica y GI • Síndrome Faloidiano (Amanitinas y falotoxinas): Toxicidad neurológica, GI y abortiva • Falsos micetismos: Consumo de hongo micetico junto a algún sustancia	A partir de tejido fúngico y orina • Cromatografía de Capa Fina • Cromatografía de Líquidos • Cromatografía de gases • ELISA	• Cuidados intensivos: vigilancia hemodinámica y metabólica • Lavado gástrico • Estabilizar al paciente • Administración de carbón • Trasplante hepático* • Prevención identificando hongos o no consumiendo hongos silvestres

Bibliografía:

- Murray P. R. (2018) Microbiología médica básica; 1ª edición; ed. Elsevier; págs. 127-151.
- Carroll K. C. y colaboradores (2016) Microbiología médica Jawetz, Melnick & Adelberg; 27ª edición; ed. McGraw Hill Education; págs. 657-694.
- Bonifaz A. (2020) Micología médica básica; 6ª edición; ed. McGraw Hill Education; págs. 1-42, 123-204, 257-338, 361-428, 445-510, 521-606, 659-665, 835-840